

動物平衡関係が保たれる。

(小学館万有百科大辞典(19植物))

鮮新統, 中新統

新生代の第三紀は, 7つの時代に分けられる。このうち, 最後期の2時代を鮮新世(約2,600万年前~1,200万年前), 中新世(約2,600万年前~1,200万年前)というが, これ等の時代に堆積形成された地層を, それぞれ鮮新統, 中新統という。

<夕行> 大気拡散シミュレーション

排出される硫酸化物, 窒素酸化物の汚染物質が地域の環境にどのように影響を与えるかをみるため, 環境濃度, 気象, 発生源の位置等コンピューターを用い実験を行い, 一定の関係をみつけたうえで地域の環境濃度を予測する手法。

大規模発生源

本県では, 一工場での年間燃料使用量が5,000 t以上(重油換算)もしくは煙突高が50メートル以上の工場, 事業場を大規模発生源として区別している。

第三紀層, 第四紀層

地質年代でいう新生代(約6,700万年前~現在)は, 約200万年前の水河期を境として二分され, 前半を第三紀, 後半を第四紀と呼んでいるが, これ等の時代に堆積, 形成された地層をそれぞれ第三紀層, 第四紀層という。

WECPNL

航空機騒音の評価単位で, 航空機騒音の大きさ, 質, 継続時間, 飛行回数, 時間帯を加味した国際単位をいう。

短期的評価

測定値を評価する際その指針値として1時間値または1時間の1日平均値を採用する方法。

地下丘陵

海面の上

陵, 谷等

地下水位観測

地下水位

地下水障害

地下水を

地盤が沈

地下水賦存量

地域に存在

いう。

地下水盆

地下水の集

昼夜等価騒音レ

夜間(22時

間帯の騒音

長期的評価

測定値を評

1日平均値

低水流量

1年365日